

Link do produktu: <https://www.diegozoo.pl/advantix-spot-on-dla-psow-o-masie-do-4kg-0-4-ml-p-2130.html>

## ADVANTIX 'SPOT-ON' DLA PSÓW O MASIE do 4kg 0,4 ML

Cena	<b>25,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Producent	<b>BAYER</b>

### Opis produktu

**Advantix Spot on zapobiega i zwalcza infestacje kleszcze** (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor* spp.) oraz pchły (*Ctenocephalides* spp.), a także odstrasza komary i muchówki (*Phlebotomus* sp.). Może być również stosowany po uprzednim uzgodnieniu z lekarzem weterynarii jako element terapii alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).

#### Skład:

Imidakloprid 40mg

Permetryna 200mg

Opakowanie jednostkowe zawiera 1 pipetę o pojemności 0,4ml roztworu do nakrapiania, przeznaczonego dla psów o wadze do 4kg.

#### Zakres działania:

- Jednorazowe zastosowanie zapobiega dalszej infestacji kleszczy przez cztery tygodnie. Kleszcze są odstraszone oraz/lub zabijane, przez co ogranicza się ryzyko wystąpienia chorób przez nie przenoszonych. Kleszcze umiejscowione na psie w momencie zastosowania preparatu zostaną zabite, ale pomimo to pozostaną wczepione i będą widoczne.
- Pchły na psie giną w ciągu jednego dnia od rozpoczęcia leczenia. Jednorazowe zastosowanie zapobiega dalszej infestacji pcheł na cztery tygodnie.
- Jednorazowe leczenie zapewnia widoczne działanie odstrasżające wobec meszek i komarów w ciągu czterech tygodni, zmniejszając przez to ryzyko wystąpienia chorób przez nie przenoszonych.

#### Ostrzeżenia:

- Nie stosować u szczeniąt poniżej 7 tygodnia życia.
- Nie stosować u kotów.

Przed zastosowaniem preparatu u psów chorych lub osłabionych należy skonsultować się z lekarzem weterynarii.

Psom nie należy pozwalać na wchodzenie do wody przez około 2 dni po zastosowaniu preparatu, z uwagi na niebezpieczeństwo, jakie może stanowić dla organizmów wodnych.

#### Dawkowanie:



---

Należy wyjąć jedną pipetę z opakowania. Trzymając pipetę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręcić i zdjąć końcówkę. Odwrócić końcówkę i umieścić drugim końcem na pipecie (zamknięcie zabezpieczające przed dostępem dzieci). Przekręcić końcówkę aby przebić zamknięcie, po czym zdjąć końcówkę z pipety. Rozsunąć sierść na grzbiecie i zawartość należy podać w równych częściach w cztery miejsca wzdłuż linii grzbietowej, od łopatek do nasady ogona. Nie należy nanosić zbyt dużej ilości roztworu w jedno miejsce, gdyż jej część może spłynąć ze zwierzęcia.